

Fonctions : généralités

Table des matières


I	Rappel sur les coordonnées	1
II	Notion de fonction	2
III	Courbe représentative	3
IV	Variations d'une fonction	4
IV.1	Sens de variation	4
IV.2	Tableau de variation d'une fonction	5
IV.3	Extremum :	7

I Rappel sur les coordonnées

Pour repérer un point dans le plan, on trace deux droites sécantes en un point O . Ces deux droites sont appelées axes.

Sur chaque axe, on choisit une unité de longueur en plaçant deux points I et J .

On dit alors que $(O ; I ; J)$ est un repère du plan.



On prend un point M quelconque ; on trace deux droites passant par M et parallèle aux axes ; elles coupent ces deux axes en M' et M'' , qui sont repérés par deux nombres x et y . x est l'abscisse de M et y l'ordonnée de M .

x et y sont alors les coordonnées de M ; on écrit $M(x ; y)$ ou $M(x_M ; y_M)$.



Définition

- On dit que le repère est orthogonal si, et seulement si, les deux axes sont orthogonaux.
- On dit que le repère est orthonormé ou orthonormal si, et seulement si, les deux axes sont orthogonaux et l'unité sur les deux axes est la même ($OI = OJ$).

II Notion de fonction



Définition

Soit $\mathcal{D}$ un intervalle de $\mathbb{R}$ ou une réunion d'intervalles.

Une fonction numérique f , définie sur $\mathcal{D}$, est un procédé qui, à chaque nombre de x de $\mathcal{D}$ associe un **unique** nombre, noté $f(x)$.

$\mathcal{D}$ est l'ensemble de définition de f ; c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe.

Le réel x est appelé la **variable**. $f(x)$ est **l'image** de x par f .

x est un **antécédent** de $f(x)$.

On écrit : $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x)$ ou plus simplement : $f : x \mapsto f(x)$.

Exemples :

1. On enregistre la température en un endroit précis sur une période de 24 heures. $T : x \mapsto y = T(x)$ où $T(x)$ est la température à l'instant x .
2. On enregistre la hauteur d'eau dans un port en fonction de l'heure (elle varie en fonction de la marée).
3. $v(x)$ est la vitesse d'une voiture à x km de son point de départ sur un circuit automobile.
4. $f(x)$ est le carré du nombre x : Sur $\mathbb{R} : f : x \mapsto x^2$.
5. $\mathcal{D} =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[: f : x \mapsto \frac{1}{x}$
 $\frac{1}{x}$ n'existe que si $x \neq 0$ car on ne peut pas diviser par 0.
Remarque : $]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$ se note aussi $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ou $\mathbb{R}^*$
6. $\mathcal{D} = [0 ; +\infty[: f : x \mapsto \sqrt{x}$
7. $\mathcal{D} =]0, 1[: p : x \mapsto y = p(x)$ où y est la première décimale de x .
On a alors $p\left(\frac{1}{3}\right) = 3$, $p(0,123) = 1$



Remarques

- Un nombre ne peut avoir qu'une seule image par une fonction f .
- Un nombre peut avoir **plusieurs** antécédents par f ; exemple : pour $f(x) = x^2$, on a $f(-2) = f(2) = 4$ donc 4 a deux antécédents par f

Exemples :

1. Sur $\mathbb{R}$, on considère la fonction $f : x \mapsto 3x^2 + 5x - 4$.
Calculer les images de 0, 3, 5 et -1.
 - $f(0) = 3 \times 0^2 + 5 \times 0 - 4 = -4$
 - $f(3) = 38$
 - $f(5) = 3 \times 5^2 + 5 \times 5 - 4 = 96$
 - $f(-1) = 3 \times (-1)^2 + 5 \times (-1) - 4 = -5$

2. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. $g(x) = x^2$.

Quels sont les antécédents (s'ils existent) de -4? de 2?

-1 a-t-il des antécédents?

Réponses :

x est un antécédent de -4 si $g(x) = -4$, donc $x^2 = -4$.

Or, $x^2 \geq 0$ donc x^2 ne peut pas être égal à -4 qui est négatif.

-4 n'a pas d'antécédent.

Les antécédents de 2 sont les nombres x tels que $x^2 = 2$, donc $x^2 = 2$.

2 a donc pour antécédents $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

(**rappel** : pour $a \geq 0$, l'équation $x^2 = a$ possède deux solutions, $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$; en effet, $x^2 = a$ s'écrit $x^2 - a = 0$, d'où $x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0$ soit $(x + \sqrt{a})(x - \sqrt{a}) = 0$ après factorisation; on a bien les deux solutions proposées, en utilisant le fait qu'un produit de facteurs est nul si, et seulement si, l'un des facteurs est nul.)

x est un antécédent de -1 si et seulement si $g(x) = -1$, donc si et seulement si $x^2 = -1$, ce qui est impossible car $x^2 \geq 0$.

-1 n'a pas d'antécédent par g .

III Courbe représentative



Définition


Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$.

La courbe $\mathcal{C}_f$, représentative de f , est l'ensemble des points $M(x; f(x))$ où $x \in \mathcal{D}$.

x est donc l'abscisse et $f(x)$ l'ordonnée d'un point M de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple :

Voici la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-1,5; 5]$



Lecture d'une image : Quelles sont les images de -1,5? de -1? de 0? de 1? de 2?

L'image de -1,5 est environ égale à -1,9;

$$f(-1,5) \approx -1,9$$

L'image de -1 est 0 : $f(-1) = 0$

L'image de 0 est 1,6 : $f(0) = 1,6$

De même : $f(1) = 1,2$; $f(2) = 0$

Lecture d'un antécédent : Quels sont les antécédents de 0? de 1? de 2? de 4?

Pour lire les antécédents de 0, on regarde les abscisses des points de la courbe qui ont 0 pour ordonnée :

Les antécédents de 0 sont -1, 2 et 4.

Antécédents de 1 : approximativement -0,5; 1,2 et 4,4.

Antécédents de 4 : il n'y en a pas sur l'intervalle considéré.

IV Variations d'une fonction

IV.1 Sens de variation




Définition

Une fonction f est croissante sur un intervalle I signifie que sur l'intervalle I , si les valeurs de la variable x augmentent, alors les images $f(x)$ augmentent aussi.

Traduction mathématique : Pour tous x_1 et x_2 de I tels que $x_1 \leq x_2$, alors $f(x_1) \leq f(x_2)$.
(une fonction croissante **conserve l'ordre**.)

Illustration graphique :




Définition

Une fonction f est décroissante sur un intervalle I signifie que sur l'intervalle I , si les valeurs de la variable x augmentent, alors les images $f(x)$ diminuent.

Traduction mathématique : Pour tous x_1 et x_2 de I tels que $x_1 \leq x_2$, alors $f(x_1) \geq f(x_2)$.
(une fonction croissante **renverse l'ordre**.)

Illustration graphique :




IV.2 Tableau de variation d'une fonction

Un tableau de variation sert à rassembler visuellement toutes les informations sur les variations d'une fonction.

Exemples :

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x^3 - 3x^2 - 12x}{2}$ sur $[-2,5 ; 3,5]$.

La courbe représentative est




Le tableau de variation de f est :

x	-2,5	-1	2	3,5
$f(x)$		3,5		3,5
	-10		-10	

Une flèche montante indique que la fonction est croissante, une flèche descendante indique que la fonction est décroissante.

2. Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction définie par : $f(x) = \frac{1}{x-2}$



La fonction f n'est **pas définie** en $x = 2$. 2 est une valeur **interdite**.

L'ensemble de définition de f est $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

On traduit cette situation par une **double barre verticale** dans le tableau de variation et une ligne pointillée dans le graphique. (On verra cela en détail dans le chapitre sur la fonction inverse.)

La fonction est décroissante sur $] -\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$. Quand x tend vers $-\infty$, $f(x)$ se rapproche de plus en plus de 0, de même que quand x tend vers $+\infty$. Le tableau de variation est :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	

IV.3 Extremum :


Définition

Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$.

f admet un maximum en $a \in \mathcal{D}$ si, pour tout x de $\mathcal{D}$, $f(x) \leq f(a)$. f admet un minimum en $a \in \mathcal{D}$ si, pour tout x de $\mathcal{D}$, $f(x) \geq f(a)$.

f admet un extremum en a si f admet un maximum ou un minimum.

Exemple : Soit la fonction f définie sur $[-6 ; 6]$ par $f(x) = 1 + \frac{3}{x^2 + 1}$ dont voici la courbe représentative :



Cette fonction est croissante sur $] -6 ; 0]$ et décroissante sur $[0 ; 6[$.


Le maximum de $f(x)$ est 4, atteint en 0 ($f(0) = 4$).

$f(-6) = f(6) = \frac{40}{37}$. Le minimum est $\frac{40}{37}$, atteint en -6 et 6.

Le tableau de variation est :

x	-6	0	6
$f(x)$	$\frac{40}{37}$	4	$\frac{40}{37}$

Exemple : Voici la courbe représentative de $f : x \mapsto \frac{4}{(x^2 + 1)}$, définie sur $\mathbb{R}$.



Le maximum est 4, atteint en 0, mais f n'a pas de minimum (0 n'est l'image d'aucun nombre).